© Антропов Ю.Ф., 2013

Ю.Ф. Антропов

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ И МОТОРИКИ КИШЕЧНИКА

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

В статье представлены результаты обследования 64 детей и подростков с функциональными нарушениями пищеварительной системы в возрасте 2–17 лет: более заметное преобладание лиц мужского пола, средний возраст, при более раннем возникновении функциональных нарушений и почти равной продолжительности расстройств, больше в группе больных с дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП). Группа больных с функциональными нарушениями моторики кишечника (ФНМК) характеризуется большей представленностью собственно депрессии, отсутствием умеренно выраженной, при большей частоте в структуре слабо выраженной скрытой депрессии, тревожного, астенотревожного и тоскливого вариантов депрессии, меньшей – астенического и тревожно-тоскливого вариантов, а также соматогенной депрессии. Проявления агрессивности отмечаются в 2,6 раза чаще у больных с ДЖВП, чем с ФНМК. Число факторов риска возникновения психического и соматического дизонтогенеза и соответственно психических и соматических расстройств больше во 2-й группе больных с ФНМК (12,6 и 12,8 на одного больного) за счет большего числа генетических (2,7 и 2,9) и психосоциальных (5,1 и 5,2), при меньшем числе церебрально-органических (4,8 и 4,7) факторов.

Ключевые слова: *психосоматика, депрессия, гастроэнтерология, дети и подростки.*

Author presents results of examination, performed in 64 children aged 2–17 years with functional disorders of alimentary system. Patients with motor disorders of biliary tract (MDBT) showed more high rate of male patients, their mean age was higher, mean age of disease manifestation was smaller and general disease duration was similar in comparison with patients with intestinal dysmotility (ID). Patients with ID were characterized by high prevalence of depression with absence of moderate depression and high rate of mild latent depression, anxious, astenic- anxious and melancholic depression, by low rate of astenic and anxious – melancholic depression and somatogenic depression. Aggressive signs occurred in patients with MDBT 2,6 times more than in patients with ID. Number of risk factors of psychic and somatic dysontogenesis and so, psychic and somatic disorders was higher in group of patients with ID (12,6/12,8 per 1 patient correspondingly) for account of more high number of genetic (2,7/2,9) and psychosocial (5,1/5,2) factors and to a lesser degree, cerebral organic factors (4,8/4,7) .

Key words: *psychosomatics, depression, gastroenterology, children and adolescents.*

Актуальность проблемы функциональных расстройств пищеварительной системы определяется их значительной распространенностью (по данным [1], они составляют 85% от всей гастроэнтерологической патологии детского возраста) и выраженным дизадаптирующим воздействием, в частности являясь нередко причиной госпитализации. Повышает значимость проблемы и риск перехода в хроническую органическую патологию, так как, по утверждению В.В. Марилова [2], функциональные и органические психосоматические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) представляют собой единый психосоматический континуум, на одном полюсе которого находится функциональная, а на другом – органическая патология.

В связи с высокой значимостью освещению отдельных вопросов проблемы функциональных расстройств пищеварительной системы у детей и подростков последние десятилетия уделяется много внимания, но в плане изучения общей группы больных, реже нарушений билиарной

Контактная информация:
Антропов Юрий Федорович – д.м.н., проф. каф. детской психиатрии и психотерапии РМАПО
Адрес: 119334 г. Москва, 5-й Донской пер., 21а
Тел.: (495) 954-13-14, **E-mail:** antropovyf@list.ru
Статья поступила 10.04.13, принята к печати 26.06.14.